

Puerto Varas.

**Ovipalpus piceus**, n. sp. — Allongé, convexe. Entièrement brun noirâtre peu brillant, pubescence jaune clair. Tête convexe à ponctuation ombiliquée forte et serrée. Labre et mandibules rongeatres. Premier article des antennes ferrugineux. Pronotum plus long que large, convexe, sinueux sur les côtés, peu rétréci en avant; angles postérieurs divergents; ponctuation comme celle de la tête. Écusson plan, subcordiforme, ponctué. Élytres plus larges que le pronotum, profondément ponctués-striés. Pattes jaunes. — Long. 45 mill.

Chili.

Ponctuation plus forte que chez *O. pubescens* Sol., surtout sur la tête et le pronotum.

---

### Description d'un *Tenebroides* nouveau du Haut-Brésil

[COL. TENEOCHILIDAE]

par A. LÉVEILLÉ.

**Tenebroides lepidus**, n. sp. — *Oblongo-oralis, rufus, subcyaneomicans, nitidissimus*: *capite prothoraceque nigro-aeneis; gula, antennis, pedibus anticis prosternoque nigro-piceis; elytris, mesosterno, metasterno, abdomine pedibusque intermediis et posticis rufis; antennarum clara magna sed tenui; capite antice excavato, valde et irregulariter punctato; prothorace parce minus valde punctato, transverso, lateribus sat fortiter rotundatis et marginatis; margine basali integra; angulis anticis marginatis, subretusis, posticis valde obtusis; elytris medio utrinque macula transversali nigra notatis, striato-punctatis, intervallis plenis, fere impunctatis; prosterno dense et fortiter punctato, meso- et metasterno fere laevibus, segmentis ventralibus medio transverse excavatis, sat tenuiter punctatis.* — Long. 7 mill., lat. 3 mill.

Amazones : Santarem (coll. A. GROUVELLE et LÉVEILLÉ, 3 exempl.).

Ovale, assez allongé, un peu convexe, brillant; à téguments bicolores : les segments antérieurs, ainsi que la première paire de pattes noir bronzé ou brun foncé, le reste du corps, en dessus comme en dessous, avec les deux autres paires de pattes, d'un rouge rosé assez clair; tête déprimée triangulairement en avant, avec une ponctuation

assez forte mais irrégulière, prothorax transverse, à côtés latéraux assez fortement arqués et marginés, marge basilaire non interrompue au milieu, angles antérieurs subémoussés, brièvement marginés en avant, les postérieurs bien marqués quoique fortement obtus, ponctuation fine et écartée; élytres coupés vers le milieu de leur longueur par une tache transversale noire n'atteignant ni la suture ni le bord latéral, légèrement déprimés entre cette tache et la région subhumérale, striés-ponctués, stries fines, entières, bien marquées sur les marges latérales, interstries presque plans et dépourvus de toute espèce de ponctuation (du moins avec un grossissement moyen). Massue des antennes large mais très mince, prosternum densément et fortement ponctué, mésosternum et métasternum presque lisses; arceaux de l'abdomen creusés transversalement au milieu et assez finement ponctués.

Cette charmante espèce, dont la couleur rappelle en plus petit celle de *Aphodius bimaculatus* Laxm., doit pouvoir varier dans la disposition des taches noires de ses élytres qui peuvent disparaître ou se développer de façon à former une bande continue traversant entièrement les élytres, d'un bord à l'autre, comme on peut l'observer chez la *Leptura distigma* Charp.

---

### Sur un *Cyrtidae* de l'ambre de la Baltique [DIPT.]

par Fernand MEUNIER.

Au cours de mes recherches diptérologiques, commencées il y a près de vingt ans, j'ai eu l'occasion d'observer plusieurs milliers d'inclusions d'insectes appartenant à diverses familles de Diptères. Ma tâche a été très ingrate, H. LOEW n'ayant fait, en 1850 <sup>(1)</sup>, que l'esquisse des groupes de mouches rencontrées par lui dans la résine oligocène.

Dans un récent envoi de Diptères tertiaires, de la collection de M. le Pr. Dr R. KLEBS, de Königsberg, j'ai trouvé des représentants de deux nouvelles familles de cet ordre, non citées par H. LOEW.

Les *Stratiomyidae* sont représentés par un genre voisin des *Hermetia* (*Hermetiella bifurcata*) <sup>(2)</sup> et par le genre *Cacosis* Walker dont quelques espèces sont actuellement cantonnées aux États-Unis (faune

(1) LOEW. Ueber den Bernstein u. die Bernsteinfauna, Meseritz.

(2) Ann. Soc. Scient. de Bruxelles [1908], p. 263.